

Empfehlungen zu Hautgewebeproben für

DIREKTE IMMUNFLUORESZENZ (DIF)

1. Bitte um Angabe der klinischen Verdachtsdiagnose und Differentialdiagnose, ggf. bekannter Immunserologie und exakter Entnahmestelle (**ERKRANKTE/NICHT ERKRANKTE HAUT; BELICHTET/UNBELICHTET**) sowie der **BESTANDSDAUER** der biopsierten Effloreszenz.

2. **Entnahmebedingungen für DIF-Proben**

bei V. a. bullöse Autoimmundermatose:

Blasenrandbereich und peribullöses Erythem/Infiltrat von frischer Effloreszenz zur Biopsie geeignet;

Sonderfall V. a. M. DUHRING:

Biopsie aus **NICHT**-erkrankter Haut (Umgebung vesikulöser Areale); ebenso bei Ig-A-linearer Dermatoze;

bei V. a. LE:

Biopsie aus erkrankter Haut, **BESTANDSDAUER** möglichst länger als 6 WOCHEN;

zur DD SLE:

Biopsie von klinisch gesunder, nicht chronisch lichtexponierter Haut (Oberarmstreckseite);

bei V. a. Vaskulitis:

Biopsie aus frisch erkrankter Haut (Effloreszenz nicht älter als 8 Stunden) ohne Sekundärveränderungen (Ulzeration).

3. **Versand ohne Zeitdruck** in DIF-Medium (Röhrchen mit gelbem Deckel), Haltbarkeit der Probe darin mindestens 1 Woche). Unbenutzte Röhrchen mit Medium im Kühlschrank mindestens 3 Monate lagerfähig.